Étiquette Supplémentaire

Dow AgroSciences

Dow AgroSciences Canada Inc. Suite 201, 1144-29 Ave N.E. Calgary, Alberta T2E 7P1

Kelthane* 50W

Acaricide agricole

GROUPE	3	ACARICIDE

ÉTIQUETTE SUPPLÉMENTAIRE

Contient du dicofol

AGRICOLE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Dicofol 50%

N° D'HOMOLOGATION 24707 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION **POISON**

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX
SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA PEAU

CONTENU NET: 3.0 kg, 3.5 kg, 20 kg, 25 kg, 544 kg, et vrac

Dow AgroSciences Canada Inc.
Suite 201, 1144 - 29 Avenue N.E.
Calgary, Alberta
T2E 7P1
1-800-667-3852

*Marque de commerce de Dow AgroSciences LLC

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Cause une lésion modérée aux yeux. Nocif si ingéré ou inhalé. Des contacts avec la peau prolongés ou fréquemment répétés peuvent causer des réactions allergiques cutanées chez certaines personnes. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer les poussières ou les bruines. Ce produit est un sensibilisant de la peau. Porter des gants résistants aux produits chimiques, une chemise à manches longues, un pantalon, des souliers er des bas pour effectuer le mélange, le chargement et l'application du produit.

Laver les vêtements de protection au détergent et à l'eau chaude. Ne pas garder et laver les vêtements de protection avec les autres vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever les vêtements immédiatement si le pesticide s'y est introduit. Bien se laver ensuite et mettre des vêtements propres.

Énoncés sur le délai de sécurité après traitement et la protection des travailleurs
Ne pas entrer dans les zones traitées sans vêtements de protection avant que le produit ne soit complètement sec. Ne pas appliquer ce produit de manière telle que des travailleurs ou d'autres personnes ne soient exposés directement ou indirectement par les dérives de buées. Les personnes non protégées devront être tenues à l'écart des zones traitées. En cas d'exposition accidentelle : appeler immédiatement un médecin, une clinique ou l'hôpital. Expliquer que la victime a été exposée à l'acaricide Kelthane 50W et décrire son état. Pour plus d'informations, consulter les directives de premiers soins.

PREMIERS SOINS :
Emporter l'étiquette du contenant, ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.
En cas de contact avec les yeux : Rincer **IMMEDIATEMENT** avec beaucoup d'eau propre pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin ou un centre antipoison **IMMEDIATEMENT** si l'irritation persiste.
En cas de contact avec la peau : Rincer **IMMEDIATEMENT** avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'irritation, faire appel à un médecin ou contacter un centre antipoison.
En cas d'ingestion : NE PAS FAIRE vomir sauf si demandé par un professionnel de la santé compétent. Si la personne est consciente, lui faire boire deux verres d'eau et consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison **IMMEDIATEMENT**. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
En cas d'inhalation : Amener la personne à l'air frais. Consulter un médecin ou contacter un centre antipoison **IMMEDIATEMENT** si des effets se produisent.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Aucun antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à instaurer en fonction des réactions du patient.

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche signalétique du produit.

PRODUIT CHIMIQUE AGRICOLE
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques ou des vêtements.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT
Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement sur les lacs, les cours d'eau ou les étangs. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant l'équipement ou en disposant des eaux de rinçage. Ne pas appliquer lorsque les conditions favorisent la dérive ou le ruissellement du produit hors des zones de traitement. Ne pas l'appliquer s'il y a des risques de dérive. Ne pas appliquer dans des conditions météorologiques propices à la dérive hors des zones traitées.

ENTREPOSAGE
Ne pas entreposer près de la pâture, des semences, des fertilisants ou des denrées alimentaires.

ÉLIMINATION
Contenants recyclables:
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1.Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2.Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants réutilisables:
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

INFORMATION GÉNÉRALE
L'acaricide Kelthane 50W est une préparation améliorée de la poudre mouillable qui procure un taux d'élimination initial et une activité résiduelle élevés contre la plupart des espèces d'acariens agricoles, y compris le tétranyque rouge du pommier, le tétranyque à deux points, le tétranyque à six points, le tétranyque du Pacifique, le ciron du troène, le tétranyque de Schoene, le tétranyque jaune (de Carpini), le tétranyque de McDaniel, le tétranyque de l'épinette, le phytopte du poirier et le phytopte du pommier. Le Kelthane est un acaricide à action spécifique qui ne tuera pas les abeilles ni les prédateurs utiles d'insectes lorsqu'utilisé tel que recommandé.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
- **NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.**
- Ne pas mettre l'acaricide Kelthane 50W dans des solutions alcalines (pH élevé) ni le mélanger à un produit à base de chaux ou contenant de la chaux. Ajuster le pH de la solution pulvérisable à un pH de 5 à 7 avec un agent tampon après avoir ajouté le Kelthane 50W au réservoir.
- Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org/.

AVIS À L'ACHETEUR/À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT POUR CERTAINES APPLICATIONS SPÉCIALES : Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour les utilisations décrites ci-dessous n'a pas été rédigé par Dow AgroSciences Canada Inc. et a été accepté aux fins d'homologation par Santé Canada en vertu du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dow AgroSciences Canada Inc. ne fait aucune assertion ni ne donne aucune garantie en ce qui concerne les allégations sur la performance (efficacité) ou la tolérance des cultures (phytotoxicité), ou les deux, lorsque ce produit est utilisé pour les cultures indiquées sur la présente étiquette.
Par conséquent, l'acheteur et l'utilisateur assument toute responsabilité en ce qui concerne l'utilisation ou les utilisations figurant sur cette étiquette et acceptent de tenir Dow AgroSciences Canada Inc. à couvert de toute réclamation relative à l'efficacité ou à la phytotoxicité, ou aux deux.

MODE D'EMPLOI

FRAMBOISE, ROUGE ET NOIRE; MÛRE; MÛRE DE LOGAN; CULTIVARS ET/OU HYBRIDES DE CES VÉGÉTAUX: Pour lutter contre le tétranyque à deux points dans les cultures de framboise, rouge et noire; mûre; mûre de Logan; cultivars et/ou hybrides de ces végétaux, appliquer le Kelthane 50W à raison de 1,5 à 3,5 kg dans 1 500 à 2 000 litres d'eau/hectare. En cas d'infestation plus grave ou si les ronciers sont larges ou le feuillage dense, utiliser le taux d'application le plus élevé. N'effectuer qu'une seule application de Kelthane 50W par saison. Délai d'attente avant récolte : 7 jours. Pour application foliaire seulement, avec équipement d'application terrestre conventionnel. Appliquer lorsque les populations d'acaricide commencent à se manifester. Consulter les conseillers agricoles afin de déterminer le moment idéal pour les applications du produit dans votre région.

Consulter l'étiquette principale de Kelthane 50W avant l'utilisation pour obtenir des détails et des instructions supplémentaires.

LIRE LES RESTRICTIONS CONCERNANT LA ROTATION DES CULTURES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE COMPLÈTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance, Kelthane 50W, acaricide du groupe 3. Toute population d'acariens peut renfermer des individus naturellement résistants à Kelthane 50W et à d'autres acaricides du groupe 3. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si ces acaricides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux acaricides:

- Dans la mesure du possible, alterner le Kelthane 50W ou les acaricides du même groupe 3 avec des acaricides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des acaricides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les acaricides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations d'acariens traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles precis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Dow AgroSciences Canada Inc. au 1-800-667-3852 ou a www.dowagro.ca.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les producuits antiparasitaires.*

AVIS À L'ACHETEUR : La garantie accordé par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation our de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

041503

Replaces Kelthane 50W F SUPP 24707 May03f